

میزان شیوع ویروس TT در جمعیت شهر اصفهان

دکتر مجید بوذری^{۱*}، نیما شیخ بیگلو^۱، دکتر طاهره زندیه^۲

۱- بخش میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه اصفهان ۲- بخش فراورده‌های بیولوژیک، سازمان انتقال خون ایران

دریافت: ۸۴/۱۱/۳۰ پذیرش: ۸۵/۱۱/۲۶

Title: Prevalence of TT virus in general population of Isfahan.

Authors: Bouzari M, (DVM, DVSt, PhD); Shaykh Baygloo N, (MSc); Zandieh T, (PhD).

Introduction: TT virus (TTV) is an unenveloped single-stranded circular DNA virus. Sensitive PCR (Polymerase Chain Reaction) methods with primers designed for very conserved regions of the viral genome (UTR) indicate high prevalence (> 90%) of TTV infection in general population of many countries world-wide. Although there has been no evidence of its relation to any liver or other specific disease to date, it is speculated that certain genotype(s) may be capable of causing hepatitis. A relationship between viral load and immune status of host is also suggested. This study was done to determine the prevalence of TTV infection in general population of Isfahan, Iran.

Methods: Serum samples were collected from 132 voluntary blood donors in Blood Transfusion Organization, Isfahan. Among them, four were positive for HBs-Ag and six for Anti-HCV antibody. DNA was extracted and subjected to PCR using consensus primers. The amplified PCR products were sequenced.

Results: TTV DNA was detected in 105 out of 132 examined samples (95% confidence interval: 73% to 86% with) These included ninety-five out of 122 healthy and 10 out of 10 hepatitis-positive sera.

Conclusion: The results showed high prevalence of TTV in general population of Isfahan which is the same as other areas studied. Determining the genotypes present in Isfahan population is suggested.

Keywords: TT virus, prevalence, hepatitis.

Hakim Research Journal 2007; 9(4): 52- 58.

* نویسنده مسؤول: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، بخش میکروبیولوژی. همراه: ۰۵۴۶ ۳۱۳ ۹۱۳-۷۹۳۲۴۵۶. نمبر: ۳۱۱-

پست الکترونیک: bouzari@sci.ui.ac.ir

چکیده

مقدمه: ویروس *TTV* (TTV) یک ویروس بدون پوشش با *DNA* تک رشته‌ای حلقوی است که مطالعات صورت گرفته با استفاده از سیستم‌های *PCR* (واکنش زنجیره‌ای پلیمراز) حساس، همراه با پرایمرهای طراحی شده برای مناطق بسیار محافظت شده ژنوم ویروسی (*UTR*) حاکی از شیوع بسیار بالای (بیش از ۹۰%) آلدگی *TTV* در بین جمعیت‌های عمومی سراسر جهان می‌باشد. بررسی‌ها نتوانسته‌اند نقش *TTV* را در بدن و همچنین ارتباط آن را با بیماری کبدی یا هر گونه بیماری خاص دیگری آشکار سازند. به طور کلی هیچ تظاهر کلینیکی که بتوان آن را مستقیماً به *TTV* نسبت داد وجود ندارد؛ اگر چه فرضیه‌هایی مبنی بر بیماری‌زا بودن ژنتوتیپ‌های خاص، همچنین ارتباط بین میزان ویروس و وضعیت ایمنی میزان ارایه شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع آلدگی *TTV* در جمعیت عمومی (افراد داوطلب اهداکننده خون) شهر اصفهان است.

روش کار: بدین منظور ۱۳۲ نمونه سرمی از افراد به ظاهر سالم (۱۲۲ نمونه) و هپاتیتی (۱۰ نمونه؛ شامل ۶ نمونه مثبت-*HCV* و ۴ نمونه مثبت *HBS-Ag*) در ۷ نوبت از تاریخ ۸۲/۱۰/۹ تا ۸۳/۴/۳۰ از بانک خون سازمان انتقال خون شهر اصفهان تهیه گردیدند. از سرم افراد استخراج شد و با استفاده از پرایمرهای جامع در معرض *PCR* قرار گرفت. همچنین محصول *PCR* تعدادی از نمونه‌ها از ژل آکارز استخراج و توالی آنها تعیین گردید.

یافته‌ها: از ۱۳۲ سرم مورد آزمایش، ۱۰۵ نمونه (۷۳٪) با فاصله اطمینان ۹۵٪ (۱۰ تا از ۱۰ نمونه هپاتیتی و ۹۵ تا از ۱۲۲ نمونه سالم) برای *DNA* ویروس *TTV* مثبت تشخیص داده شدند.

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از معمول بودن ویرمیای *TTV* در جمعیت شهر اصفهان همانند دیگر نقاط جهان است. تعیین ژنتوتیپ‌های موجود در جمعیت شهر اصفهان پیشنهاد گردید.

گل واژگان: ویروس *TT*، شیوع، هپاتیت.

مقدمه

(ALT) را نشان می‌دادند و عاری از ویروس‌های هپاتیت A تا G بودند، شناسایی کردند (۲). *TTV* ویروسی بدون پوشش با kb DNA تک‌رشته‌ای حلقوی است که طول ژنومش حدوداً ۳/۸ و قطر آن ۳۰–۳۲ نانومتر می‌باشد (۳–۵). این ویروس از انتشار بالایی در سراسر جهان برخوردار است و مطالعات صورت گرفته با استفاده از سیستم‌های *PCR*^۳ حساس، همراه با پرایمرهای طراحی شده برای مناطق بسیار محافظت شده ژنوم ویروسی (*UTR*)^۴، حاکی از شیوع بسیار بالای (بیش از ۹۰%) آلدگی *TTV* در بین جمعیت‌های عمومی سراسر جهان می‌باشد (۶–۹). اگر چه در ابتدا تصور می‌شد که *TTV* تنها به وسیله انتقال خون منتقل می‌شود، با توجه به شیوع بسیار زیاد آن در جمعیت‌های عمومی سراسر جهان، همچنین تشخیص آن در نمونه‌های بیولوژیکی مختلف (پلاسم، مدفوع، بزاق، ترشحات گردن رحم، مایع آمنیوتیک، شیر، پوست، اشک و ...) احتمال

در طی چند دهه گذشته با کشف ۵ نوع اصلی ویروس‌های هپاتیت (A) و توسعه روش‌های تشخیصی حساس برای هر کدام، پیشرفت‌های قابل توجهی در مورد توصیف ویروس‌های هپاتوتروپیک انسانی صورت گرفته است. به هر حال هنوز بخش نسبتاً کوچکی از موارد هپاتیتی حاد و مزمن باقی مانده است که قابل استناد به این ویروس‌ها یا به ویروس‌هایی که گمان می‌رود برخی اوقات باعث آسیب‌های کبدی بدون بروز عالیم مشخصه خاص شوند (انتروویروس‌های معین، آدنوویروس‌ها، پاراویروس B19 انسانی و غیره)، نیستند (۱). همزمان با تلاش جهت روشن کردن این فرم‌های ناشناخته، نیشی‌زاوا^۱ و همکارانش، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷، ویروس *TT*^۲ را در سرم بیماران ژاپنی مبتلا به هپاتیت بعد از انتقال خون با منشأ نامشخص که سطوح افزایش یافته آلانین آمینو ترانسفراز

^۳ Polymerase Chain Reaction

^۴ Untranslated region

^۱ Nishizawa

^۲ Torque Teno Virus

غیرکدکننده و بسیار محافظت شده ژنوم ویروسی (UTR) و جهت تکثیر یک قطعه ۱۹۹bp طراحی شده‌اند (۹). با استفاده از این پرایمرها، شناسایی تقریباً تمام ژنتیپ‌های TTV امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است که پرایمرهای مورد نظر (T801 و T935) توسط MOLBIOL Syntheselabor آلمان ساخته شدند.

PCR اسیدهای نوکلئیک استخراج شده با استفاده از آنزیم Smar Taq DNA Polymerase گرفت و برنامه PCR شامل یک دوره دناتوره شدن در ۹۴°C به مدت ۵ دقیقه، ۴۰ دوره تکثیر شامل دوره‌های دناتوره شدن، ۵۷°C به مدت ۲۵ ثانیه و ۷۲°C به مدت ۳۰ ثانیه و یک دوره طویل شدن نهایی در ۷۲°C به مدت ۵ دقیقه بود. در این مطالعه نمونه‌های منفی دوباره مورد آزمایش قرار گرفتند، یعنی هم PCR نمونه‌های منفی و هم خود نمونه‌های DNA مخصوص استخراج شده، برای بار دوم در مععرض PCR قرار گرفتند. باید خاطرنشان شود که در همه آزمایش‌ها کنترل منفی به کار برده شد.

باندهای حاصله بعد از الکتروفورز فراورده‌های PCR در ژل آکارز ۰.۲٪ حاوی اتیدیوم بروماید، بهوسیله نور UV مورد مشاهده قرار گرفتند. از ۱۰۰ bp DNA Ladder (سیناژن، ایران) به عنوان مارکر جهت تعیین اندازه قطعات به دست آمده استفاده گردید. برای استخراج DNA (قطعه ۱۹۹bp) از ژل آکارز، از کیت استخراج DNA (فرمتاس، سیناژن، ایران) استفاده شد. جهت تأیید وجود TTV DNA در نمونه‌های مورد آزمایش، قطعه تکثیر شده بهوسیله PCR، توسط شرکت SEQLAB (آلمان) تعیین توالی^۳ شد و توالی نوکلئوتیدی به دست آمده با توالی‌های موجود در EMBL، با استفاده از روش جستجوی WU-Blast ۲ مقایسه گردید.

نتایج

همانطور که انتظار می‌رفت محصول PCR یک فراورده ۱۹۹bp بود (شکل ۱) که در ۱۰۵ نمونه (شامل هر ۱۰ نمونه هپاتیتی و ۹۵ نمونه سالم) از ۱۳۲ سرم مورد آزمایش (یعنی ٪۷۹/۵ نمونه‌ها) تشخیص داده شد. سایر اطلاعات در رابطه با توزیع موارد مثبت و منفی در جدول ۱ آمده است. لازم به ذکر است که در سری اول آزمایش‌های PCR، باند مربوط به فراورده ۱۹۹bp در ۷۵ نمونه از ۱۳۲ سرم مورد آزمایش مشاهده گردید. چون

می‌رود که راه‌های مختلفی برای انتشار آن وجود داشته باشد (۱۰-۱۷). بررسی‌ها نتوانسته‌اند نقش TTV را در بدن، همچنین ارتباط آن را با بیماری کبدی یا هرگونه بیماری خاص دیگری آشکار سازند (۲ و ۵ و ۱۱ و ۲۸-۲۸؛ چنانچه در بعضی از بررسی‌ها نقش TTV در بیماری کبدی مثبت (۲۰ و ۲۳ و ۲۷) و در دیگر مطالعات منفی (۲۲ و ۲۸ و ۲۹) پیشنهاد شده است. در این مورد فرضیه‌های زیادی وجود دارد؛ مثلاً پیشنهاد شده است که تیپ‌ها یا تحت تیپ‌های معینی از TTV ممکن است هپاتوتروپیک باشند (۲۴ و ۳۰ و ۳۱). همچنین ارتباط بین میزان ویروس و وضعیت ایمنی میزان مورد بررسی قرار گرفته است (۸ و ۳۲ و ۳۳).

امروزه هیچ تظاهر بالینی که بتوان آن را مستقیماً به TTV نسبت داد، وجود ندارد. به هر حال کشف TTV به تازگی صورت گرفته است، درگیری آن در پاتولوژی مشخص و ارتباطش با میزان به صورت فرضیه است و هنوز موارد ناشناخته زیادی درباره آن وجود دارد.

با توجه به این که در آینده ممکن است نقش تیپ‌های خاصی از این ویروس به عنوان عامل بیماری‌زا مشخص شود، بررسی وضعیت آلدگی به این ویروس در هر جامعه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این ارتباط، در این مطالعه میزان شیوع آلدگی TTV در جمعیت عمومی (افراد داوطلب اهداکننده خون) شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار


۱۳۲ نمونه سرمی از افراد به ظاهر سالم (۱۲۲ نمونه) و هپاتیتی (۱۰ نمونه؛ شامل ۶ نمونه مثبت Anti-HCV و ۴ نمونه مثبت HBs-Ag) در ۶ نوبت از تاریخ ۸۲/۱۰/۹ تا ۸۳/۴/۳۰ از بانک خون سازمان انتقال خون شهر اصفهان تهیه گردیدند و تا زمان استفاده در دمای ۲۰-۲۰°C نگهداری شدند.

بعد از تیمار شدن ۲۰۰ میکرولیتر از هر نمونه سرمی با پروتئیناز K (۰/۵mg/ml) در حضور (۰/۰۲M) NaCl و (۰/۰۲M) SDS برای ۲ ساعت در ۶۵°C با استفاده از فیل / کلروفرم / ایزوآمیل الكل استخراج و با اتانول رسوب داده شد. نهایتاً رسوب خشک DNA در ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکرولیتر از آب مقتدر استریل یا محلول TE^۱ حل و در دمای ۲۰°C ذخیره گردید.

پرایمرها: پرایمرهای مورد استفاده در این تحقیق، T801 و T935 بودند که بهوسیله تاکاهاشی^۲ و همکارانش برای منطقه

¹ Tris-HCl buffer (10mM, pH=8.0) Containing 1mM EDTA

² Takahashi



شکل ۱- نتایج حاصل از الکتروفورز قطعات DNA به دست آمده در آزمایش PCR مربوط به سرم‌های مورد آزمایش با استفاده از پیرایندهای T801 و T935 و M مارکر ۱۰۰ bp و ۳ نمونه‌های مثبت با زاندهایی در موقعیت ۱۹۹ bp- ۴: کنترل منفی (DNA TTV) با زاندهایی در موقعیت ۱۹۹ bp- ۱: نتایج حاصل از الکتروفورز قطعات DNA به دست آمده در آزمایش PCR مربوط به سرم‌های مورد آزمایش با استفاده از پیرایندهای T801 و T935 و M مارکر ۱۰۰ bp و ۳ نمونه‌های مثبت با زاندهایی در موقعیت ۱۹۹ bp- ۴: کنترل منفی (DNA TTV)

در شکل ۲ مقایسه توالی نوکلئوتید به دست آمده از قطعه تکثیر شده (فراورده ۱۹۹bp) با توالی مربوط به اولین ژنوم جدا شده زبانی TTV، یعنی TA278 (قابل دسترسی با شماره GenBank AB008394 در EMBL و DDBJ) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود تشابه توالی زیبادی (%) بین توالی به دست آمده و توالی مربوط به سویه TA278 وجود دارد.

در جدول ۲، هشت سویه TTV شامل AF159224، AJ620226، AJ620219، AJ620225، AJ620222 و AJ620221 که دارای بیشترین تشابه (%) با توالی DNA به دست آمده از آزمایش PCR هستند، نشان داده شده است. در شکل ۳ نیز توالی های مربوط به همان هشت سویه با توالی نوکلئوتیدی به دست آمده

احتمال می‌رفت که تعداد کپی‌های مربوط به TTV DNA، در نمونه استخراج شده و یا سرم کم باشد و به همین خاطر باند قابل ملاحظه‌ای در روی ژل ایجاد نشده باشد، تمام نمونه‌های منفی، برای بار دوم مورد آزمایش قرار گرفتند، یعنی هم محصول PCR نمونه‌های منفی و هم نمونه‌های DNA استخراج شده مجدداً در معرض PCR قرار گرفتند.

جدول ۱- مشخصات نمونه‌های سرمی مورد آزمایش قرار گرفته

| نمونه‌های نمیت | درصد نمونه‌های منفی | TTV نمیت | TTV نمیت | تعداد | سن (سال) | |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|----------|
| ۷۶ | ۱۲ | ۳۸ | ۵۰ | ۱۸-۳۰ | | سال |
| ۷۶/۷۴ | ۱۰ | ۳۳ | ۴۳ | ۳۰-۴۰ | | |
| ۸۲/۴۵ | ۳ | ۱۴ | ۱۷ | ۴۰-۵۰ | | |
| ۸۳/۳۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ≥۵۰ | | |
| ۱۰۰ | - | ۴ | ۴ | ۲۰-۴۱ | مثبت | HBs-Ag |
| ۱۰۰ | - | ۶ | ۶ | ۲۵-۶۳ | مثبت | Anti-HCV |
| ۷۹/۵ | ۲۷ | ۱۰۵ | ۱۳۲ | - | | کل |

جهت اطمینان بیشتر، DNA از سرم‌هایی که بعد از آزمایش دوم PCR منفی تشخیص داده شدند، استخراج گردید و دوباره در معرض PCR قرار گرفت. ۳۰ نمونه از ۵۷ نمونه‌ای که در بار اول منفی تشخیص داده شده بودند، بعد از آزمایشات بعدی از نظر وجود قطعه ۱۹۹ bp، مشت تشخیص، داده شدند.

شکل ۲- مقایسه توالی نوکلئوتیدی DNA حاصل از آزمایش PCR (شماره ۱) با توالی مربوط به اولین سویه TTV، یعنی TA278 (قابل دسترسی با شماره AB008394 در DDBJ، EMBL و GenBank) (شماره 2) با استفاده از نرم افزار WU-blast در محیط EMBL.

میزان شیوع ویروس TT در جمعیت شهر اصفهان

جدول ۲- هشت سویه از ویروس TT که در جستجوی WU-blast-2 در محیط EMBL دارای بیشترین تشابه با توالی نوکلئوتیدی به دست آمده، هستند.

| ردیف | شماره دسترسی ^۱ | متنا | طول ^۲ | همانندی ^۳ |
|------|---------------------------|--|------------------|----------------------|
| ۱ | AF159224 | TT virus strain TTmBJ unknown gene (Japan, 1999). | ۱۹۴ | ۹۴ |
| ۲ | AF159225 | TT virus strain TTm5 unknown gene (Japan, 1999). | ۱۹۴ | ۹۳ |
| ۳ | AJ620226 | TT virus ORF1 and ORF2, isolate tth4 (Germany, 2004). | ۳۷۷۲ | ۹۲ |
| ۴ | AJ620219 | TT virus ORF1 and ORF2, isolate tth9 (Germany, 2004). | ۳۷۵۵ | ۹۲ |
| ۵ | AJ620220 | TT virus ORF1 and ORF2, isolate tth16 (Germany, 2004). | ۳۷۵۶ | ۹۲ |
| ۶ | AJ620221 | TT virus ORF1 and ORF2, isolate tth17 (Germany, 2004). | ۳۷۵۷ | ۹۲ |
| ۷ | AJ620225 | TT virus ORF1 and ORF2, isolate tth31 (Germany, 2004). | ۳۷۵۷ | ۹۲ |
| ۸ | AJ620222 | TT virus ORF1 and ORF2, isolate tth25 (Germany, 2004). | ۳۷۵۸ | ۹۲ |

۱- Accession number in the DDBJ, EMBL and GenBank databases - ۲- طولی از ژنوم ویروس که تعیین توالی شده است. - ۳- Identity

```

2 [ 81
Sequence 2:199
1 EM_VI:AF159224 2:195 1:194 CTACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTCTATGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
2 EM_VI:AF159225 2:195 1:194 CTACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTGTATGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
3 EM_VI:AJ620226 3:199 4:200 CTACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTCTATGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
4 EM_VI:AJ620219 3:199 4:200 -TCCGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTTATGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
5 EM_VI:AJ620220 3:199 4:200 -TACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTCTACGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
6 EM_VI:AJ620221 3:199 4:200 -TACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTCTACGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
7 EM_VI:AJ620225 3:199 4:200 -TACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTCTACGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT
8 EM_VI:AJ620222 3:199 4:200 -TACGTCACTAACCAACGTGACTCCCGCAGGCCAACCCAGAGTCTACGTCGTGACTTCCGGCATGGTGATCGTGATAATT

82 161
Sequence 2:199
1 EM_VI:AF159224 2:195 1:194 ATAAAGCGGTGCACTTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACACGGAGGGTGATCTCGGGCT
2 EM_VI:AF159225 2:195 1:194 ATAAAGCGGTGCACTTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGTGATCTCGGGCT
3 EM_VI:AJ620226 3:199 4:200 ATAAAGCGGTGCACTTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGTGATCTCGGGCT
4 EM_VI:AJ620219 3:199 4:200 ATAAAACG-TGCACCTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGAGATCTCGGGCT
5 EM_VI:AJ620220 3:199 4:200 ATAAAACG-TGCACCTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGAGATCTCGGGCT
6 EM_VI:AJ620221 3:199 4:200 ATAAAACG-TGCACCTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGAGATCTCGGGCT
7 EM_VI:AJ620225 3:199 4:200 ATAAAACG-TGCACCTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGAGATCTCGGGCT
8 EM_VI:AJ620222 3:199 4:200 ATAAAACG-TGCACCTCCGAATGGCTGAGTTTCCACGCCCGTCCGAGCGAACACCGGGAGATCTCGGGCT

162 199
Sequence 2:199
1 EM_VI:AF159224 2:195 1:194 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
2 EM_VI:AF159225 2:195 1:194 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
3 EM_VI:AJ620226 3:199 4:200 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
4 EM_VI:AJ620219 3:199 4:200 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
5 EM_VI:AJ620220 3:199 4:200 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
6 EM_VI:AJ620221 3:199 4:200 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
7 EM_VI:AJ620225 3:199 4:200 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG
8 EM_VI:AJ620222 3:199 4:200 CGGAGGGCGGGTGCCTGAGTTTACACACCGCAG

```

شکل ۳- مقایسه توالی نوکلئوتیدی DNA به دست آمده با توالی های مربوط به ۸ سویه TTV که در جدول ۲ نشان داده شده اند.

بحث و نتیجه گیری

سیکل های این برنامه PCR، ممکن است به علت کم بودن تعداد کپی DNA باند قابل ملاحظه ای در روی ژل ایجاد نگردد. از این رو فراورده های PCR نمونه های منفی دوباره در معرض PCR گرفتند تا از مثبت یا منفی بودن نمونه ها اطمینان حاصل شود و همانطور که انتظار می رفت تعدادی از نمونه ها بعد از PCR دوم، مثبت شدند. از طرفی چون ممکن است تعداد کپی های DNA مربوط به TTV در نمونه استخراج

در سیستم PCR همراه با پرایمرهای T801 و T935، از آنزیم Ampli Taq Gold DNA Polymerase شامل ۵۵ سیکل تکثیر بوده است (۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶). در این مطالعه به علت عدم دسترسی به آنزیم مذکور از آنزیم Smar Taq DNA Polymerase استفاده شد و چون این آنزیم احتمالاً در سیکل های بالاتر از ۴۰ غیرفعال می شود، برنامه PCR روی ۴۰ دوره تکثیر تنظیم شد. با توجه به تعداد کم

تشخیص TTV در هر ۱۰ نمونه هپاتیتی، ممکن است نشانگر سینزیسم این ویروس با ویروس‌های هپاتیتی باشد ولی چون تعداد نمونه‌های هپاتیتی مورد آزمایش اندک می‌باشد نمی‌توان در این باره به درستی نتیجه‌گیری کرد. با توجه به شیوع بسیار بالای آلودگی TTV در بین افراد به ظاهر سالم سراسر جهان پیشنهاد شده است که Yك ویروس DNA غیرپاتوژنیک در انسان هاست (۶-۹ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۹)، اگر چه نقش پاتوژنیک آن هنوز در حال بررسی است و پیشنهاداتی مبنی بر بیماری‌زا بودن سویه‌ها یا ژنتوتیپ‌های خاصی از TTV وجود دارد (۲۴ و ۳۰ و ۳۱). در نتیجه بررسی‌های مداوم و پایداری در رابطه با میزان شیوع و خصوصیات TTV موردنیاز است تا برداشت کاملی از اهمیت بالینی این ویروس به دست آید.

تشکر و قدردانی

در پایان از راهنمایی‌های جناب آقای دکتر منوچهر توسلی (استادیار محترم بخش ژنتیک گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان) و جناب آقای دکتر هوشنگ طالبی (استادیار محترم گروه آمار دانشگاه اصفهان) و مسؤولین محترم سازمان انتقال خون شهر اصفهان چهت در اختیار گذاشتن نمونه‌های سرمی تقدیر و تشکر می‌گردد.

References

- Bendinelli M, Pistello M, Maggi F, et al. Molecular properties, biology, and clinical implications of TT virus, a recently identified widespread infectious agent of humans. *Clin Microbiol Rev* 2001; 14: 98–113.
- Nishizawa T, Okamoto H, Konishi K, et al. A novel DNA virus (TTV) associated with elevated transaminase levels in posttransfusion hepatitis of unknown etiology. *Biochem Biophys Res Commun* 1997; 241: 92–97.
- Itoh K, Takahashi M, Fukuda M, et al. Visualization of TT virus particles recovered from the sera and feces of infected humans. *Biochem Biophys Res Commun* 2000; 279: 718–724.
- Miyata H, Tsunoda H, Kazi A, et al. Identification of a novel GC-rich 113-nucleotide region to complete the circular, single-stranded DNA genome of TT virus, the first human circovirus. *J Virol* 1999; 73: 3582–3586.
- Mushahwar IK, Erker JC, Muerhoff AS, et al. Molecular and biophysical characterization of TT virus: evidence for a new virus family infecting humans. *Proc Natl Acad Sci USA* 1999; 96: 3177–3182.
- Abe K, Inami T, Asano K, et al. TT virus infection is widespread in the general populations from different geographic regions. *J Clin Microbiol* 1999; 37: 2703–2705.
- Huang L, Jonasson TQ, Hungnes O, et al. High prevalence of TT virus-related DNA (90%) and diverse viral genotypes in Norwegian blood donors. *J Med Virol* 2001; 64: 381–386.
- Pistello M, Morrica A, Maggi F, et al. TT Virus levels in the plasma of infected individuals with different hepatic and extrahepatic pathologies. *J Med Virol* 2001; 63: 189–195.
- Takahashi K, Hoshino H, Ohta Y, et al. Very high prevalence of TT virus (TTV) infection in general population of Japan revealed by a new set of PCR primers. *Hepatol Res* 1998; 12: 233–239.
- Fornai C, Maggi F, Vatteroni ML, et al. High prevalence of TT virus (TTV) and TTV-like minivirus in cervical swabs. *J Clin Microbiol* 2001; 39: 2022–2024.
- Gad A, Tanaka E, Orii K, et al. Clinical significance of TT virus infection in patients with chronic liver disease and volunteer blood donors in Egypt. *J Med Virol* 2000; 60: 177–181.
- Inami T, Konomi N, Arakawa Y, et al. High prevalence of TT virus DNA in human saliva and semen. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 2407–2408.
- Ishikawa T, Hamano Y, Okamoto H. Frequent detection of TT virus in throat swabs of pediatric patients. *Infection* 1999; 27: 298.
- Matsubara H, Michitaka K, Horike N, et al. Existence of TT virus DNA and TTV-like mini virus DNA in infant cord blood: mother-neonatal transmission. *Hepatol Res* 2001; 21: 280–287.
- Okamoto H, Akahane Y, Ukita M, et al. Fecal excretion of a nonenveloped DNA virus (TTV) associated with posttransfusion non A-G hepatitis. *J Med Virol* 1998; 56: 128–132.
- Osiowy C, Sauder C. Detection of TT virus in human hair and skin. *Hepatol Res* 2000; 16: 155–162.
- Ross RS, Viazov S, Runde V, et al. Detection of TT virus DNA in specimens other than blood. *J Clin Virol* 1999; 13: 181–184.
- Charlton M, Adjei P, Poterucha J, et al. TT-virus infection in North American blood donors, patients with fulminant hepatic failure, and cryptogenic cirrhosis. *Hepatology* 1998; 28: 839–842.

شده و یا سرم کم باشد، در آزمایش اول PCR تعدادی از نمونه‌های مثبت، منفی تشخیص داده شدند. در نتیجه تکرار PCR نمونه DNA استخراج شده و یا حتی استخراج دوباره DNA از سرم و PCR آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه مشابه توالی بسیار زیادی بین توالی DNA موردنظر و توالی‌های موجود در EMBL مشاهده شد که دلیل بر اثبات وجود TTV DNA در نمونه‌های سرمی مورد آزمایش است. چون یک بخش ۲۲۲bp از منطقه ORF1 ژنوم ویروسی جهت تعیین ژنتوتیپ و شاخه فیلوژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۳۱ و ۳۴ و ۳۵) و با توجه به این که در این مطالعه منطقه بسیار محافظت شده غیرکدکننده (5'-UTR) از ژنوم ویروسی مورد بررسی قرار گرفت، مشکل می‌توان توان نظر به ژنتوتیپ خاصی از TTV نسبت داده شود. تشخیص ویروس TTV در اکثر افراد مورد بررسی قرار گرفته (۷۹/۵٪) حاکی از معمول بودن ویرمیای TTV در جمعیت عمومی شهر اصفهان می‌باشد که با نتایج به دست آمده از بررسی‌های مشابه در سراسر جهان مطابقت دارد (۶ و ۹ و ۱۴). در این تحقیق میزان آلودگی در گروه‌های سنی ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۰ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۵۰ سال بیشتر از ۵۰ سال به ترتیب ۷۶/۷۶٪، ۷۶/۷۴٪ و ۸۳/۳۳٪ و ۸۲/۳۵٪ بود که تقریباً نزدیک به هم بوده و نشان می‌دهد که میزان ویرمی در گروه‌های سنی مختلف تقریباً یکسان است. از طرفی

- 19- Cheng J, Hada T, Fukui K, et al. Detection of TTV DNA in serum of patients with chronic liver disease and interferon efficacy. *J Hepatol Res* 1999; 14: 97–104.
- 20- Ikeda H, Takagi M, Inoue K, et al. Infection with an unenveloped DNA virus (TTV) in patients with acute or chronic liver disease of unknown etiology and in those positive for hepatitis C virus RNA. *J Hepatol* 1999; 30: 205–212.
- 21- Itoh K, Hirakawa K, Okamoto H, et al. Infection by an unenveloped DNA virus associated with non-A to –G hepatitis in Japanese blood donors with or without elevated ALT levels. *Transfusion* 1999; 39: 522–526.
- 22- Naoumov NV, Petrova EP, Thomas MG, et al. Presence of a newly described human DNA virus (TTV) in patients with liver disease. *Lancet* 1998; 352: 195–197.
- 23- Okamoto H, Nishizawa T, Kato N, et al. Molecular cloning and characterization of a novel DNA virus (TTV) associated with posttransfusion hepatitis of unknown etiology. *Hepatol Res* 1998; 10: 1–16.
- 24- Okamoto H, Nishizawa T, Ukita M. A novel unenveloped DNA virus (TT virus) associated with acute and chronic non-A to G hepatitis. *Intervirology* 1999; 42: 196–204.
- 25- Pineau P, Meddeb M, Raselli R, et al. Effect of TT virus infection on hepatocellular carcinoma development: results of a Euro-Asian survey. *J Infect Dis* 2000; 181: 1138–1142.
- 26- Shang D, Lin YH, Rigopoulou I, et al. Detection of TT virus DNA in patients with liver disease and recipients of liver transplant. *J Med Virol* 2000; 61: 455–461.
- 27- Tanaka H, Okamoto H, Luengrojanakul P, et al. Infection with an unenveloped DNA virus (TTV) associated with posttransfusion non-A to G hepatitis in hepatitis patients and healthy blood donors in Thailand. *J Med Virol* 1999; 56: 234–238.
- 28- Umemura T, Tanaka E, Ota M, et al. TT virus infection in an area of highendemicity for hepatitis C. *Hepatol Res* 1999; 13: 212–220.
- 29- Yamamoto T, Kajino K, Ogawa M, et al. Hepatocellular carcinomas infected with the novel TT DNA virus lack viral integration. *Biochem Biophys Res Commun* 1998; 251: 339–343.
- 30- Itoh K, Takahashi M, Ukita M, et al. Influence of primers on the detection of TT virus DNA by polymerase chain reaction. *J Infect Dis* 1999; 180: 1750–1751.
- 31- Okamoto H, Takahashi M, Nishizawa T, et al. Marked genomic heterogeneity and frequent mixed infection of TT virus demonstrated by PCR with primers from coding and noncoding regions. *Virology* 1999; 259: 428–436.
- 32- Shibayama T, Masuda G, Ajisawa A, et al. Inverse relationship between the titer of TT virus DNA and the CD4 cell count in patients infected with HIV. *Aids* 2001; 15: 563–570.
- 33- Touinssi M, Gallian P, Biagini P, et al. TT virus infection: prevalence of elevated viremia and arguments for the immune control of viral load. *J Clin Virol* 2001; 21: 135–141.
- 34- Okamoto H, Kato N, Izuka H, et al. Distinct genotypes of a nonenveloped DNA virus associated with posttransfusion non-A to G hepatitis (TT virus) in plasma and peripheral blood mononuclear cells. *J Med Virol* 1999; 57: 252–258.
- 35-Takayama S, Yamazaki S, Matsuo S, et al. Multiple infection of TT virus (TTV) with different genotypes in Japanese hemophiliacs. *Biochem Biophys Res Commun* 1999; 256: 208–211.